

~~~~~

*Notice sur quelques objets d'histoire naturelle  
des provinces méridionales du Caucase que  
l'on peut se procurer par les soins de  
Mr. Hohenaker.*

*Testudo. L.*

Prix  
en Duvats  
neufs d'Holl.

1. *T. orbicularis* L. Gm. Long. du  
Carapace 6''3'', Larg. 4 $\frac{1}{2}$ —  
2 $\frac{1}{4}$ '' préparé pour être  
empaillé . . . . .
2. *T. graeca*. L. Gm. Long. 8 $\frac{1}{2}$ —5''  
Larg. 6 $\frac{1}{2}$ '' — 3'' préparé.
3. — — — Long. 1' 2'' en esprit  
de vin . . . . .
4. *T. ?* Long. 7 $\frac{1}{2}$ '' Larg. 5 $\frac{1}{2}$ '' haut.  
3''. Le Carapace tubercu-  
leux, pointu en arrière,  
couleur d'un brun foncé  
olivâtre; le plâtron brun-  
noirâtre avec peu de taches  
blanches; près les pieds

$\frac{1}{3}$

$\frac{1}{3}$

$\frac{1}{6}$



|                                                                                                                                                                                                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| avec de grandes taches rouges d'orange. Tête et extrémités noirâtres avec de stries rouges d'orange; préparée pour l'empaill. .                                                                          | $\frac{1}{2}$ |
| 5. <i>T. geometrica</i> L. Gm. Long. 4''<br>Larg. $2\frac{3}{4}$ '' . . . . .                                                                                                                            | $\frac{1}{3}$ |
| <i>Lacerta</i> . L. en esprit de vin.                                                                                                                                                                    |               |
| 1. <i>L. Stellio</i> Daud. Long. 1' 1''<br>Largeur de l'abdomen, Larg. $2\frac{1}{4}$ '' brun en dessus avec de taches blanchâtres et noirâtres, qui sont rougeâtres sur la tête et sur le cou . . . . . | $\frac{1}{3}$ |
| 2. <i>L. viridis</i> ? L. 1' . . . . .                                                                                                                                                                   | $\frac{1}{6}$ |
| 3. <i>L. ———</i> L. 1' semblable à No. 2. avec une bande blanche en dessous, et une autre bleuâtre en dessus . . . . .                                                                                   | $\frac{1}{6}$ |
| 4. <i>L. ———</i> L. 1'; ressemblant à No. 3. avec des grandes taches noires en dessus et de côtés.                                                                                                       | $\frac{1}{5}$ |



Prix  
en ducats.

---

5. }  
6. } L. — — — trois petites espèces  
7. } de Lezards ; chacun .

$\frac{1}{6}$

8. L. *Scincus Daud.* Long.  $1\frac{1}{2}$ " ,  
de la queue 7" , Largeur  
de la tête près du cou 8" ,  
du bas-ventre 9" ; brun en  
dessus avec de petites taches  
rouges irrégulièrement dis-  
posées , une bande mince  
jaune de safran sur les cô-  
tés, passant jusqu'aux cuis-  
ses ; elle est jaune de cire  
depuis la cuisse jusqu'à la  
racine de la queue ; abdomen  
blanc de lait , d'un violet  
clair de côté ; la queue  
jaune en dessous . . . .

$\frac{1}{2}$

9. L. *apoda*. L. *Sheltopusik Daud.*,  
*Proctopus Pallasii* Fischer.  
*affinis* ; Long. 3' 5" , de  
la queue 2' 6" . Les petits  
pieds avec un ongllet ; le



corps présente 24 angles par les carines des écailles imbriquées, la queue près de l'anus 18. Des plis nombreux sur les côtés garnis de petites écailles. Brun-olivâtre en dessus, d'un jaune-sâle en dessous, avec de taches brunes et rouges.

 $\frac{1}{2}$ 

10. L. ——— Semblable, à No. 9.

Long. du corps.  $10\frac{1}{4}$ " , de la queue  $2\frac{1}{3}$ " ; en dessus brun d'ombre clair, avec des stries transversales interrompues et en zigzag plus foncées; en dessous d'un bleu-blanchâtre sâle. Les côtés et la partie inférieure de la tête blanchâtres avec des stries de travers d'un brun foncé.

 $\frac{1}{2}$ 

*Boa*. L.

1. *B. tatarica*, Mus. Berol. Doubl.

Verz. 1823. p. 104. L.



11'' 1' 3 $\frac{1}{4}$ '' . Couleur prin-  
cipale - brune claire . . .

Prix  
en Ducats.

1.

*Coluber. L.*

1. C. 172. 46. Long. 4 $\frac{1}{2}$ ' , de la queue 6 $\frac{1}{2}$ '' ;  
Larg. du nez 1' , de la tête 2'' ,  
du cou 1' $\frac{1}{4}$ '' , du bas-ventre 2' $\frac{1}{4}$ '' .  
Venimeux. Toutes les écailles,  
à l'exception de celles sous la  
queue carinées, obtuses en forme  
de lance. La tête cordiforme ,  
couverte avec de petites écailles  
imbriquées , qui entourent les  
yeux en cercle. Nez obtus. L'iris  
est jaune - rougeâtre avec beau-  
coup de petits points noirs.  
Prunelle perpendiculaire, en forme  
de lancette. Brun en dessus nuagé,  
avec de taches plus foncées de  
côtés. L'abdomen est rougeâtre  
parsemé de taches noires. *Une  
peau sèche; un individu en esprit  
de vin , 4' 2'' de larg.*



1. C. 199. 93. Long.  $3\frac{1}{2}'$  de la queue  $10\frac{1}{2}''$  Larg. de la tête et du cou  $7'''$ , de l'abdomen  $10'''$ ; couleur principale grise - bleuâtre, chaque écaille avec des stries longitudinales d'un roux ferrugineux. Rouge de brique en dessous; Iris brun - rougeâtre. Peau séchée et un autre en esprit de vin  $4\frac{1}{4}''$  de long.
3. C. 177. 73. Long.  $1' 10\frac{1}{2}''$ , de la  $5\frac{1}{4}$ ; Larg. de la tête  $6'''$ , du cou  $5'''$ , de l'abdomen  $6\frac{1}{4}'''$ ; brun - foncé en dessus, plus clair sur les côtés, les bords des écailles jaune d'ocre. Blanc - sâle en bas. Les écussons de l'abdomen avec une petite strie noire de côté. Les yeux sont noirs.
4. C. 177. 75. Long.  $4\frac{1}{2}''$ , de la queue  $10''$ ; Largeur de la tête  $1'$ , du cou  $8'''$ , de l'abdomen  $1' 3'''$ . Les écailles du dos jusqu'à l'anus, à l'exception de la série la plus proche de l'abdomen, enfoncées



au milieu, et en forme de lozanges. Un enfoncement sur la tête entre les yeux. Couleur en dessus verte - noirâtre, plus claire vers la tête, jaune de soufre en dessous; sur les côtés deux stries indistinctes blanches, dont l'inférieure va jusqu'à l'anus, mais la supérieure passe au milieu du corps. Par devant les yeux une tache blanche.

5. C. 210. 80. Long. 3'  $3\frac{1}{2}$ " , de la queue  $8\frac{1}{2}$ " ; Larg. de la tête 10" , du cou 7" , de l'abdomen 11" ; écailles en lozanges obtuses. Brun foncé en dessus, avec une série de taches grandes, irrégulières souvent confluentes, noires, bordées de brun - clair. Une série semblable sur les côtes, de plus petites taches, bordées de blanc en bas, qui passe sur la queue en une strie brune - foncé; abdomen blanc de lait (dans deux exemplaires rougeâtre), parsemé de pe-



tites taches noires; lèvres supérieures blanchâtres; avec une tache brune sous l'oeil, et une strie passant de l'oeil jusqu'à la bouche, de la même couleur.

6. C. 180. 70. Long.  $10\frac{1}{4}''$ , de la queue  $2\frac{1}{3}''$ ; Larg. de la tête  $3'''$ , du cou  $2'''$ , de l'abdomen  $2\frac{1}{2}'''$ ; en dessus brun d'ombre clair (plus foncé avec des stries brunes d'ocre-clair sur les écailles rhomboidales); en dessous blanc-verdâtre-sâle. Tête et nuque noires, les deux entourées d'un arc rouge-vermillon.

Entre les yeux des taches confluentes de la même couleur, le nez brun rougeâtre. Les côtés du cou garnis de quelques petites taches noires. L'iris est noir. Un autre exemplaire a  $1' 5\frac{1}{2}''$  de longueur.

7. C. 176. 72. Longueur  $10''$ , de la queue  $2'' 2'''$ ; Largeur de la tête  $4'''$ , du cou  $2\frac{1}{2}'''$ , de l'abdomen  $4\frac{1}{2}'''$ ;



les écailles du dos arrondies et carinées à l'exception de deux séries près de l'abdomen, mates en dessus, et brillantes en dessous. Couleur de dessus grise-cendré-foncé, avec quatre séries de petites taches noires placées en quinconce, qui alternent avec des blanches dans la série inférieure. Noir en dessous avec les bords des écussons gris, qui terminent plus ou moins sensiblement en jaune-sâle. Les yeux proéminens. L'iris en est noir avec un cercle jaune en dedans. Un exemplaire avec la pointe de la queue grise en dessus et noire en dessous de  $\frac{1}{2}$ '' de longueur fut trouvé sous une pierre près de la rivière Gandscha; il va aussi à l'eau. Un autre exemplaire de couleur principale grise-verdâtre a 1' 9'' de longueur.

8. C. 171. 58 — 63. Semblable à No.7, sans taches blanchâtres, avec les bords



des écussons rouges - orange , ou rouges de brique 1' 3'; demeure près des eaux.

**9. C. 180. 67. Long. 1' 3 $\frac{1}{2}$ "**, semblable à NO.7.

brun - fonce en dessus avec des taches noires indistinctes ; bleu-noirâtre en dessous , avec des bords des écussons rouges de cinnabre - clair ; pris dans l'eau.

**10. C. 172. 62. Long. 1' 10"** semblable à

NO.7. Brun - noirâtre en dessus avec une série de taches noires , de chaque côté ; gris - bleuâtre en dessous, les bords des écussons et une partie des écailles de la queue blancs - rougeâtre. Le dessous et les côtés de la tête rougeâtres, avec une petite tache rougeâtre derrière les yeux , et une grande sémilunaire rouge-vermillon derrière les joues.

**11. C. 177. 57. Longueur 2'10"**, semblable à

N.7. Vert d'olive en dessus , noir en dessous ; les bords des



écussons d'un jaune d'orange  
clair.

12. C. 221. 58. Long.  $2'5\frac{1}{2}''$ , de la queue  
 $4''$ ; Larg. de la tête  $8''$ , du cou  
 $4\frac{1}{2}''$ , de l'abdomen  $6''$ ; Ecailles  
ovoïdes, imbriquées de côté.

Couleur principale en dessus rouge  
de chair, étroitement parsemé  
de points noirs, avec trois séries  
de taches grandes, arrondies et  
rhomboidales, rouges-brunâtres  
qui alternent et dont la série du  
milieu est plus foncée. Tête en  
dessus noirâtre, blanchâtre en  
dessous, ovoïde, avec des joues  
très enflées. Les yeux proémi-  
nents, l'iris jaune de cire avec  
une prunelle perpendiculaire et  
en forme de losange.

13. C. Longueur  $2'$  semblable à N. 12. Bru-  
nâtre avec des taches brunes  
foncées.

14. C. Long.  $2' 2''$  et un autre exemplaire  
 $1' 7''$ ; semblable à N. 12. Gris  
avec des taches brunes-noirâtre.



15. C. 204. 70. Longueur 4', de la queue  $9\frac{1}{3}''$ ; Largeur de la tête 1" 1"', du cou, 9"', de l'abdomen 1" 2". Les écailles supérieures carénées. Couleur principale en dessus et sur les côtés jaune de cire; une série de taches grandes, arrondies et brunes - clair sur les côtés; deux séries de plus petites en bas jaunâtres, tachetées de noirâtre. La tête brune - noirâtre en dessus, jaune de côté et rougeâtre en dessous.

16. C. 177. 65. Long. 2'  $5\frac{1}{2}''$ , de la queue  $5\frac{3}{4}''$ ; Largeur de la tête  $8\frac{1}{2}'''$ , du cou 6"', de l'abdomen 9". Les écailles supérieures sont carénées; en dessus et des côtés noir de jay, avec de petites taches brunes - clair en dessus et blanches de côtés; les bords des écussons sont en alternant, plus ou moins blancs. Tête et cou de côtés et en dessous rou-



géâtres. Des taches rouges de cinnabre derrière les joues.

17. C. 216. 58. Long. 11'', de la queue  $1\frac{1}{2}$ ''; Largeur de la tête 4''' , hauteur 3''' , de l'abdomen  $4\frac{1}{2}$ ''' ; Couleur principale en dessus brune-clair ; une bande jaune - clair au milieu du dos , sur le côté de laquelle une série de taches noirâtres ; gris - noirâtre en dessous.

18. C. 216. 64. Longueur 2'  $1\frac{2}{3}$ '' , de la queue  $2\frac{1}{4}$ '' ; Largeur de la tête 5''' , hauteur 6''' ; de l'abdomen 4''' . Couleur principale en dessus brune-clair avec de petites taches brunes-rougeâtre et noirâtre. Une série de taches grandes irrégulières noires sur le dos; deux séries sur les côtés de taches plus petite dont l'inférieure est peu distincte ; brun - rougeâtre - clair en dessous avec des taches noirâtres.

19. C. 218. 103. Long. 3' 9'' , de la queue 1' ; Largeur de la tête. 8''' ,



hauteur 5''' , de l'abdomen,  $5\frac{1}{2}$ ''' .  
 Brun-olivâtre en dessus, blanc de  
 lait en dessous. Dès deux côtés  
 du cou une série de taches ar-  
 rondies foncées, bordées de blanc;  
 le long du côté du corps une  
 série de petites taches noirâtres;  
 une strie blanche devant et der-  
 rière l'oeil ; deux sutures longi-  
 tudinales sur l'abdomen.

*Anguis. L.*

1. A. 140. 124. Longueur  $8\frac{1}{2}$ '' , de la queue  
 $4\frac{1}{2}$ '' . Les yeux peuvent se fermer.  
 Trace de l'oreille. Brun en dessus  
 avec des lignes doublées noires.  
 Les côtés sont brunes-rougeâtre ,  
 un peu plus clair vers le dessus ,  
 noirâtre en dessous. L'iris est  
 brun - rougeâtre.

2. A. *lumbricalis* ? L. Long. 10'' — 1'3'. Les  
 yeux sous les écailles. La queue  
 conique , plus grosse que la tête,  
 avec un dard; brunâtre en dessus,  
 rougeâtre en dessous.



3. A. 138. 126. Longueur  $1' 2\frac{1}{2}''$ , de la queue  $7\frac{1}{3}''$ ; Larg. de la tête et du cou  $6'''$ , de l'abdomen  $6\frac{1}{2}'''$ . Des yeux qui peuvent être fermés. Oreille visible. Langue large. Brun-olivâtre et noirâtre en dessus avec trois bandes caténulées noirâtres. Derrière la nuque et sur chaque côté trois séries longues de dix taches irrégulières bleues d'azur. Rougeâtre dessous, avec des bandes longitudinales pointillées de noir. Pointe de la queue conique et noire en dessous.

*Nota.* Les couleuvres N. 4. 17. 19. et *Anguis* N. 1. ne se trouvent que dans un seul exemplaire et ne peuvent être distribuées qu'après avoir reçu un second exemplaire. Le prix des serpens est dans des grandes commissions, la pièce à  $\frac{1}{3}$  Ducat holl. neuf; dans de petites commissions on paye pour un serpent de  $3' \frac{1}{2}$  Ducat; pour de plus petits  $\frac{1}{3}$  Ducats. Dès qu'ils seront systématiquement définis, il y aura un autre prix. Des exempla-



ires endommagés d'espèces rares peuvent être  
 délivrés à un prix plus médiocre.

Depenses pour vases , esprit de vin, em-  
 ballage et transport sont aux fraix de l'a-  
 cheteur.



# BULLETIN

de la

## Société Impériale

des Naturalistes

---

DE MOSCOU.

---

Tome III. année 1831.

---

~~~~~

M O S C O U.

DE L'IMPRIMERIE DE L'UNIVERSITÉ IMPÉRIALE.

Sm 1831.