

tienen color gris pizarra oscuro manchado de negro. Región gular de color negro uniforme.

Medidas: Cabeza-cuerpo: 46,25 mm; Peso: 1,5 gr; Longitud del píleo: 9,6 mm; Altura de la cabeza: 3,45 mm; Anchura del píleo: 4,45 mm; Longitud de la pata anterior: 13,8 mm; Longitud de la pata posterior: 22,85 mm; Longitud del pie: 10,75 mm; Cola: 80 mm. Folidosis: Gularia: 26; Dorsalia: 57; Ventralia: 27; Collaria: 11; Poros femorales: 16; Laminillas bajo el 4.º dedo: 25. A cada lado de la cabeza: 7 supralabiales, 6 infralabiales, 4 supraoculares completas y 11 gránulos supraciliares. No posee placa masetérica y la escama rostral no contacta con la internasal.

Aparte de su carácter melánico, la descripción del ejemplar se ajusta en todo a la del resto de individuos de la especie estudiados en el área salmantina (PÉREZ-MELLADO, 1981).

BIBLIOGRAFÍA

- ARNOLD, E. N. (1973): Relationships of the Palearctic lizards assigned to the genera *Lacerta*, *Algyroides* and *Psammotrommus* (Reptilia, Lacertidae). *Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. (Zool)* 25: 289-366.
- BOULENGER, G. A. (1920): *Monograph of the Lacertidae*. Vol. I. Brit. Mus. Nat. Hist. London. 352 pp.
- KLEMMER, K. (1959): Systematische Stellung und Rassengliederung der Spanischen Mauereidechse, *Lacerta hispanica*. *Senck. Biol.* 40: 245-250.
- PÉREZ-MELLADO, V. (1981): La lagartija de Bocage, *Podarcis bocagei* (Seoane, 1884): Primeros datos sobre su distribución, colorido y ecología. *Amphibia/Reptilia* 3/4: 253-268.
- SALVADOR, A. (1980): Materiales para una "Herpetofauna balearica" 4. Las poblaciones de lagartija balear (*Lacerta lilfordi*) del archipiélago de Cabrera. *Actas I Reunión Iberoamer. Zool. Vert.*: 401-454.

(Recibido 17, may 1983)

VALENTÍN PÉREZ-MELLADO
Departamento de Zoología
Facultad de Biología
Universidad de Salamanca
SALAMANCA (España)

SOBRE UN EJEMPLAR MELÁNICO DE *Podarcis hispanica* (STEINDACHNER, 1870)

Si bien se conocen numerosos casos de melanismo insular en el género *Podarcis* (ver por ejemplo SALVADOR, 1980) existen pocas menciones en la literatura de individuos melánicos en poblaciones continentales. Tan sólo BOULENGER (1920) cita la existencia de ejemplares melánicos de *Podarcis muralis* procedentes de Francia e Italia. No hemos encontrado, asimismo, referencias sobre dichos mutantes en *Podarcis hispanica* ni en este último autor ni en otros posteriores como KLEMMER (1959) ó ARNOLD (1973). Por ello creemos de interés reseñar aquí el hallazgo de un individuo melánico de esta especie.

Se trata de una hembra subadulta capturada el día 3 de mayo de 1983 bajo una piedra cerca del Arroyo de las Uces, en el término municipal de Cabeza de Caballo, en el Noroeste de la provincia de Salamanca (coordenadas U.T.M. 29TQF0553) a unos 700 m s.n.m. (Depositada en la colección herpetológica del Dpto. de Zoología de la Univ. de Salamanca con el núm. 01.03.05.83). Coloración: Dorso, cabeza y parte dorsal de la cola de color negro uniforme. En la zona ventral presenta escamas negras en su mitad superior y gris-azulado oscuro en la inferior. Este mismo tono es patente en las dos series longitudinales ventrales de verticilos caudales así como en la zona interna de patas anteriores y posteriores. La zona preanal y el área ocupada por los poros femorales