

BULLETIN
DU
MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

ANNÉE 1966. — N° 2

472^e RÉUNION DES NATURALISTES DU MUSÉUM

20 JANVIER 1966

PRÉSIDENTE DE M. LE PROFESSEUR J.-L. HAMEL

COMMUNICATIONS

**REPTILES ET AMPHIBIENS RÉCOLTÉS
PAR LA MISSION FRANCO-IRANIENNE**

Par J. GUIBÉ

Au cours d'une mission en Iran, M. A. VILLIERS a rapporté au Laboratoire d'Herpétologie une collection de Reptiles et d'Amphibiens dont nous donnons la liste ci-dessous.

Reptiles.

Clemmys caspica caspica Gmelin. — 1 ex. juvénile ; Bandar Pahlavi, nord Iran, bord de la mer Caspienne.

Testudo graeca ibera Pallas. — 1 ex. ; Dacht Argen (2 000 m.), à 60 km à l'ouest de Shiraz (20-III-1965).

Agamura persica (A. Duméril). — 1 ex. ; Zahedan (1 400 m.), est Iran (IV-1965).

Bunopus tuberculatus Blanford. — 3 ♂, 2 ♀ ; Chahbabar, sud Iran, sur le Golfe d'Oman (11-IV-1965) ; 3 ♂ ; Bandar Langeh, sud Iran, sur le golfe persique (III-1965).

Cyrtodactylus scaber (Heyden). — 1 ♂, Bandar Abbas, sud Iran, sur le détroit d'Ormuz ; 1 ex., Gorgan, nord Iran (1-IV-1965) ; 1 ♂, 1 ♀, Bandar Langeh (III-1965).

Hemidactylus turcicus (L.). — 1 ♂, 1 ♀, Chahbabar (11-IV-1965).

- Microgecko helenae* Nikolsky. — 1 ♀, 100 km au nord d'Iranshar (1 800 m.), sud-est Iran (15-iv-1965). L'espèce a été signalée et décrite par NIKOLSKY de la province d'Arabistan (= Khuzistan) au sud-ouest de l'Iran, elle a été signalée, avec doute, du sud-est iranien par MERTENS (1956), elle est par ailleurs connue du Pakistan.
- Tropiocolotes steudneri* (Peters). — 1 ♀, Bandar Langeh (III-1965). La présence de *T. steudneri* en Iran élargi considérablement vers le nord-est l'aire de répartition de l'espèce qui n'était connue jusqu'alors, dans la région asiatique, que de l'ouest de l'Arabie et d'Israël.
- Agama agilis isolepis* Blgr. — 1 ex., Khash (1 200 m.), est Iran (16-iv-1965); 2 ex., 240 km au nord de Shiraz; 1 ex., Chahbabar (14-iv-1965).
- Agama microlepis* (Blanford). — 1 ex., 40 km au nord de Gonabad, est Iran (iv-1965); 2 ex., 120 km au nord de Bojnurd, nord-est Iran (30-iv-1965).
- Phrynocephalus scutellatus* (Olivier). — 2 ex., Khash (1 200 m.); 3 ex., 240 km au nord de Shiraz; 5 ex., Zahedan (1 400 m.), est Iran (iv-1965).
- Ophisaurus apodus* (Pallas). — 1 ex., 120 km à l'ouest de Bijnurd, nord-est Iran.
- Anguis fragilis colchicus* (Nordmann). — 2 ex., 80 km au nord-ouest de Bandar Pahlevi, nord Iran.
- Eremias velox persica* Blanford. — 1 ♂, Khash (1 200 m.) (16-iv-1965); 1 juv., 40 km au nord de Gonabad (iv-1965).
- Eremias guttulata watsonana* Stolickza. — 1 ♂, Chahbabar (11-iv-1965).
- Acanthodactylus cantoris cantoris* Gthr. — 2 ♀, Chahbabar (11-iv-1965); 1 ♀ Khash (1 400 m.) (iv-1965).
- Lacerta viridis strigata* Eichw. — 1 ex., Gorgan, nord Iran (1-iv-1965).
- Ablepharus brandti* Strauch. — 1 ex., Sarvestan, sud Iran (21-III-1965); 1 ex., Firusabad, 20 km au sud de Chalus, nord Iran (23-v-1965).
- Ophiomorus brevipes* (Blanford). — 1 ex., Khash (1 200 m.) (16-iv-1965).
- Eryx jaculus* (L.). — 1 ex., 40 km au nord de Gonabad (iv-1965).
- Psammophis lineolatus* (Brandt). — 1 ex., 100 km à l'ouest de Meched (29-iv-1965).
- Natrix natrix persa* (Pallas). — 2 ex., Bandar Pahlavi.
- Enhydrina schistoza* (Daudin). — 1 ex., Chahbabar (iv-1965).

Batraciens.

- Bufo olivaceus* Blanford. — 2 ex., Minab, sud Iran, à l'est de Bandar Abbas (30-III-1965).
- Bufo viridis* Laurenti. — 7 ex., Zabol, est Iran.