

ANNUAIRE
DU
MUSÉE ZOOLOGIQUE
DE
L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES
DE ST.-PÉTERSBOURG.

TOME XVI.


1911.

AVEC 8 PLANCHES, 4 CARTES ET 61 FIGURES DANS LE TEXTE.

RÉDIGÉ PAR

N. Adelung.

ÉDITION DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES.



ST.-PÉTERSBOURG.

IMPRIMERIE DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES.

(Vass. Ostr., 9-ème ligne, № 12).

1912.

Гады, собранные въ окрестностяхъ станціи
„Иланской“ Сибирской желѣзной дороги въ
1910 году.

С. М. Чугунова.

[Съ табл. IV.]

[S. M. Čugunov. Notice sur les amphibiens et les reptiles, recoltés dans les environs de la station Ilanskaia du chemin de fer Transsibérien en 1910 (avec pl. IV)].

(Представлено 12 января 1911 г.).

Станція сибирской желѣзной дороги „Иланская“ находится въ 26 верстахъ отъ г. Канска, въ предѣлахъ Енисейской губерніи, на 756 верстѣ отъ г. Иркутска и 2292 в. отъ ст. Челябинскъ, приблизительно подъ $56^{\circ}22'$ сѣверной широты и $65^{\circ}80'$ вост. долготы отъ Пулкова. Станція расположена въ широкой долинѣ, образованной расходящимися отрогами съ запада Енисейскаго Становаго хребта и съ юга Саянскаго. Мѣстность частью сухая, покрытая высокимъ березовымъ колкомъ, частью низменная, болотистая. На сѣверной сторонѣ станціи протекаетъ рѣчка Иланка, питающаяся прилегающими къ ней болотами и выбивающими изъ подошвы холмовъ родниками; у г. Канска она впадаетъ въ рѣку Канъ. Въ верстѣ отъ станціи, при этой рѣчкѣ устроенъ прудъ, по обѣ стороны котораго мною были произведены сборы лягушекъ, тритоновъ и живородящихъ ящерицъ. Въ четырехъ верстахъ ниже по той же рѣчкѣ Иланкѣ расположенъ, при мельницѣ купца Северунова, другой прудъ; здѣсь, среди березоваго колка и деревянныхъ построекъ, были произведены сборы исключительно прыткихъ ящерицъ (*Lacerta agilis*). По разсказамъ, здѣсь ранѣе водились и змѣи, но въ настоящее время въ ближайшихъ окрестностяхъ ст. Иланской жабы и змѣи не встрѣчаются.

Въ теченіе іюня 1910 года мною собрано было всего 178 спиртовыхъ препаратовъ гадовъ, именно: 16 экз. сибирскаго тритона, 58 лягушекъ, 1 экз. сѣрой жабы, 14 живородящихъ ящерицъ и 89 прыткихъ ящерицъ.

Коллектирование гадовъ казалось мнѣ интереснымъ по той причинѣ, что, насколько извѣстно, въ этой мѣстности ранѣе ихъ никто не собиралъ. Дѣятельнымъ помощникомъ по сбору гадовъ былъ М. С. Чугуновъ, участковый желѣзнодорожный врачъ. Обработка собраннаго матеріала произведена въ зоологическомъ кабинетѣ Томскаго университета подъ руководствомъ проф. Н. О. Кащенко.

I. Amphibia.

1. *Salamandrella keyserlingii* DUBOWSKI.

Въ Енисейской губерніи тритонъ указанъ только для Минусинскаго края¹⁾.

Въ теченіе іюня, съ 11 по 25 число, мною взято, преимущественно на сѣверной сторонѣ иланскаго пруда, 16 экземпляровъ изъ-подъ гнилыхъ сырыхъ лѣсинъ и карягъ, а иногда и въ ращелинахъ лѣсинъ. Животныя смирно лежали среди мокрой растительной гнили и, при открытіи, зигзагообразными движеніями зарывались въ эту гниль, видимо стараясь избѣжать яркаго свѣта и вліянія теплаго, сухаго воздуха: сборы производились въ ясные, жаркіе дни. Среди взятыхъ оказалось 10 экземпляровъ взрослыхъ и 6 молодыхъ, меньшаго размѣра.

Размѣры молодыхъ слѣдующіе:

Размѣры въ миллиметрахъ:	1	2	3	4	5	6
Длина тѣла	72	78	64	64	65	65
„ туловища	47	48	44	40	40	46
„ хвоста	25	30	20	24	25	19
„ головы	11	12	10	10	10	10
Ширина головы наибольшая	7	8	7	7	7	7
Высота хвоста	5	6	5	4	4	4

1) Никольскій, А. М. — „Пресмыкающіяся и земноводныя Россійской Имперіи“. — Записки Импер. Академіи Наукъ. VIII серія. Т. XVII. № 1. 1905. Стр. 439.

Размѣры взрослыхъ:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Длина тѣла	101	87	117	98	98	100	105	102	105	104
„ туловища	59	60	68	58	58	62	60	62	64	62
„ хвоста	42	27	49	40	40	38	45	40	41	42
„ головы	14	12	15	13	13	12	14	13	14	15
Ширина головы наибольш.	9	10	10	10	8	10	10	9	9	10
Высота хвоста	6	7	7	7	6	7	8	6	7	6

Спина темнокоричневаго цвѣта, на срединѣ ея тянется продольный желобокъ, имѣющій видъ черной линіи; передній конецъ спинныхъ темнокоричневыхъ полосъ, расширяясь, продолжается на затылокъ. Вдоль желоба замѣчаются неправильной формы черныя пятнышки. Бока темнѣе спины; на границѣ спины и боковъ находится продольный рядъ черноватыхъ пятенъ; снаружи послѣднихъ протянута свѣтлокоричневая полоска съ черными, часто размѣщенными, пятнышками. Брюшко свѣтлѣе спины, съ сѣроватыми пятнами; поперекъ его замѣчаются 12—14 бороздокъ или складокъ, которыя переходятъ и на бока; въ слабой степени бороздки замѣтны также въ передней половинѣ хвоста.

Ланцетовидный хвостъ сильно сжатъ съ боковъ, верхній и нижній его края пріострены, конецъ его закругленъ, какъ у вертикально стоящей пластинки. На срединѣ своей длины хвостъ нѣсколько выше, чѣмъ при основаніи, но у двухъ экземпляровъ эта особенность не выражена. У короткохвостаго экземпляра (№ 2) хвостъ выше на концѣ и въ срединѣ истонченнаго края имѣетъ вырѣзку, что можетъ быть объяснено прижизненнымъ поврежденіемъ.

Относительно складокъ на брюхѣ проф. Никольскій говоритъ, что таковыхъ у сибирскаго тритона 12—13; проф. Кащенко находилъ 13 складокъ, а число раздѣляющихъ ихъ линій 12; на это послѣднее число указываетъ и Strauch. У иланскихъ тритоновъ число раздѣляющихъ линій въ двухъ случаяхъ насчитано 14, слѣд. складокъ имѣется 15.

Проф. Кащенко говоритъ, что „слѣды подобныхъ же складокъ, хотя не вполне ясныя, можно видѣть и кзади отъ задней конечности“²⁾; тоже наблюдается и у иланскихъ тритоновъ, но проф. Никольскій не упоминаетъ о такихъ слѣдахъ на хвостѣ сибирскаго тритона.

2) Кащенко, Н. О. — „Сибирскій четырехпалый тритонъ“. Извѣстія Имп. Томскаго университета, 1896, стр. 6.

2. *Rana arvalis* NILSS. — Лягушка болотная.

3. *Rana muta* LAUR. — Лягушка травяная.

Въ монографіи А. М. Никольскаго не отмѣчено нахожденіе *arvalis* въ предѣлахъ Енисейской губерніи, если не считать замѣтки, что „изъ Сибири на востокъ отъ Нижней Тунгузки въ нашемъ Музеѣ (Академіи Наукъ) нѣтъ ни одного экземпляра“³⁾; что же касается *muta*, то, по указаніямъ, собраннымъ г. Никольскимъ, послѣдняя была находима въ восточной Сибири, — въ Красноярскѣ, Иркутскѣ, около Байкала и далѣе до острова Сахалина включительно⁴⁾.

Rana arvalis NILSS.

Встрѣчалась вмѣстѣ съ *Rana muta* на болотахъ, прилегающихъ къ иланскому пруду съ южной его стороны; собрано было 17 экземпляровъ, которые раздѣлены при описаніи на двѣ группы:

1) задняя нога, вытянутая впередъ, тибіо-тарсальнымъ сочлененіемъ доходитъ до конца морды.

1.—1⁵⁾. Рыльце острое. Затылочное пятно по срединѣ раздѣлено на два, расположенныхъ подъ угломъ. Брюшко бѣлое съ мелкими сѣренькими пятнами. Спина темно-бурая. — Самецъ.

Длина тѣла 51 mm., длина задней ноги 85 mm.

На передней лапкѣ 2-й палецъ короче 1-го на одинъ суставъ.

2.—2. Рыльце болѣе тупое. Затылочное пятно состоитъ изъ трехъ темнобурыхъ пятенъ, расположенныхъ треугольникомъ. Брюшко бѣлое. Спина темнобурая, по бокамъ черныя полосы одного цвѣта съ височными пятнами. — Самка.

Длина тѣла 60 mm., задняя нога 95 mm.

На передней лапкѣ 2-й палецъ равенъ 1-му.

3) Указан. соч., стр. 364.

4) Ibid., стр. 357.

5) Первая цифра означаетъ нумеръ по порядку, вторая — нумеръ группы.

- 3.—3. Рыльце острое. Типичное Λ -образное пятно на затылкѣ темносѣраго цвѣта; спина свѣтлосѣрая. Брюшко бѣлое.— Самка.

Длина тѣла 41, задняя нога 60 mm.

На передней лапкѣ 2-й палецъ равенъ 1-му.

- 4.—4. Рыльце острое. Затылочное пятно сѣраго цвѣта, спина сѣро-зеленоватая; брюшко бѣлое. — Самка.

Длина тѣла 55, задняя нога 92 mm.

На передней лапкѣ 2-й палецъ короче 1-го.

II) задняя нога, вытянутая впередъ, тибіо-тарсальнымъ сочлененіемъ не доходить до конца морды; рыльце острое.

- 5.—1. Характерное затылочное пятно рѣзко выдѣляется на сѣромъ фонѣ спины, отъ концовъ его вдоль спины тянутся черныя полосы; кнаружи отъ послѣднихъ — свѣтлыя тонкія, а затѣмъ продольныя темныя полосы. Брюшко бѣлое. Пяточное сочлененіе заходитъ за передній край глаза.

Длина тѣла 43, задней ноги — 65 mm.

- 6.—2. Затылочное пятно въ видѣ густаго треугольнаго мазка. Спина бурая съ темными продольными пятнами по сторонамъ. Брюшко бѣлое. Пяточное сочлененіе достигаетъ передняго края глаза.

Длина тѣла 43, задней ноги 69 mm.

- 7.—3. Затылочное пятно едва замѣтно. Спина сѣро-стальная, съ черными полосами по сторонамъ. Брюшко чисто бѣлое. Пяточное сочлененіе достигаетъ передняго края глаза.

Длина тѣла 40, задней ноги 57 mm.

- 8.—4. Затылочное пятно въ видѣ ромба, спина темнобурая съ черными полосами по сторонамъ. Брюшко бѣлое. Пяточное сочлененіе достигаетъ передняго края глаза.

Длина тѣла 52, задняя нога 83 mm.

- 9.—5. Затылочное пятно въ видѣ двухъ темныхъ пятенъ. Спина желтовато-бурая. Брюшко чисто бѣлое. Пяточное сочлененіе достигаетъ передняго края глаза.

Длина тѣла 55, задняя нога 87 mm.

- 10.—6. Затылочное пятно слабо замѣтно. Спина сѣрая. Брюшко бѣлое. Пяточное сочлененіе достигаетъ задняго края глаза.

Длина тѣла 29, задняя нога 40 mm.

11.—7. Затылочное пятно въ видѣ скобки, со сходящимися впередъ отростками. По сѣро-бурой спинѣ разсѣяны черныя пятна. Брюшко бѣлое съ немногими сѣрыми пятнами въ переднихъ его углахъ. Пяточное сочлененіе не достигаетъ передняго края глаза.

Длина тѣла 45, задней ноги 75 mm.

12.—8. Затылочное пятно составлено изъ двухъ пятенъ. Спина темнобурая съ разсѣянными черными пятнами. Брюшко блѣдножелтовато-зеленоватое. Пяточное сочлененіе достигаетъ передняго края глаза. — Длина тѣла 62, задней ноги 103 mm.

13.—9. Затылочное пятно характернаго очертанія, сѣрое. Спина свѣтлосѣровато-синеватая. Брюшко бѣлое. Пяточное сочлененіе достигаетъ передняго края глаза. — Длина тѣла 27, задней ноги 42 mm.

14.—10. Темносѣрое затылочное пятно выражено рѣзко. Спина сѣрая, въ срединѣ и по сторонамъ тянутся параллельно черныя пятна. Брюшко чисто бѣлое. Пяточное сочлененіе достигаетъ передняго края глаза. — Длина тѣла 45, задней ноги 67 mm.

15.—11. Черное затылочное пятно рѣзко выражено. Спина темнобурая, вдоль ея тянутся двѣ черныя полосы, на бокахъ — другія. — Брюшко бѣлое. Пяточное сочлененіе достигаетъ передняго края глаза. — Длина тѣла 42, задней ноги 63 mm.

16.—12. Характерное затылочное пятно выражено. Спина сѣрая. Брюшко бѣлое. Пяточное сочлененіе достигаетъ задняго края глаза. — Длина тѣла 29, задняя нога 40 mm.

17.—13. Затылочное пятно рѣзко выражено. Спина сѣро-стальнаго цвѣта. Брюшко чисто бѣлое. Пяточное сочлененіе не достигаетъ задняго края глаза. — Длина 27, задняя нога 34 mm.

Rana muta LAUR., *Rana fusca* RÖSEL.

По окраскѣ этотъ видъ распадается на три группы:

I. Зеленовато-сѣрая спина и бока покрыты продольными черными пятнами, часто сливающимися въ узкія полосы. Брюшко желтоватое, съ разсѣянными сѣрыми пятнами. Рыльце въ большей или меньшей степени тупое.

№№ по порядку группы.	Длина тѣла.	Длина задней ноги.	Пяточное сочлененіе дости- гаетъ:	1 и 2 пальцы передней лапки.
1—1	51	79	передняго края глаза	1 = 2
2—2	64	103	почти конца рыльца	1 = 2
3—3	43	68	конца рыльца	1 = 2
4—4	55	93	почти конца рыльца	1 = 2
5—5	52	89	заходить на 4 mm. за рыльце	1 > 2
6—6	43	70	конца рыльца	1 = 2
7—7	45	70	заходить за передн. край глаза	1 = 2
8—8	31	47	передняго края глаза	1 = 2
9—9	27	42	тоже	1 < 2
10—10	30	43	задняго края глаза	1 < 2
11—11	36	51	тоже	1 = 2
12—12	43	70	конца рыльца	1 < 2
13—13	29	47	передняго края глаза	1 < 2
14—14	50	74	задняго края глаза	1 < 2
15—15	48	74	передняго края глаза	1 > 2
16—16	29	42	задняго края глаза	1 < 2
17—17	35	54	передняго края глаза	1 = 2
18—18	53	85	задняго края глаза	1 = 2
19—19	27	46	конца рыльца	1 < 2
20—20	50	80	передняго края глаза	1 = 2
21—21	57	93	тоже	1 = 2
22—22	46	75	задняго края глаза	1 > 2
23—23	33	49	тоже	1 < 2
24—24	49	77	передняго края глаза	1 < 2
25—25	62	103	конца рыльца	1 > 2

II. По сѣро-зеленоватой или сѣро-стальной (№№ 31—32) спинѣ протянуты сѣрыя полосы или сливающіяся между собой пятна, по наружнымъ краямъ которыхъ проходятъ бѣлыя полосы (железистые шнуры); послѣднія снаружи ограничены темными полосками. Брюшная поверхность, а также спина, бока и бедра покрыты сверхъ пестрой (зеленоватой и сѣрой) окраски красными точечными пятнами, слѣгка возвышающимися, придающими кожѣ шероховатость на подобіе шагреня. Брюхо бѣлое, со свѣтло-сѣрыми и красными пятнами. — Рыльце болѣе острое, чѣмъ у предыдущей группы.

26—1	53	80	задняго края глаза	1 = 2
27—2	56	95	конца рыльца	1 = 2
28—3	54	78	задняго края глаза	1 < 2
29—4	43	65	тоже	1 < 2
30—5	47	75	передняго края глаза	1 = 2

№№	Длина тѣла.	Длина задней ноги.	Пяточное сочлененіе достигаетъ:	1 и 2 пальцы передней лапки.
31—6	58	102	конца рыльца	1 = 2
32—7	58	88	задняго края глаза	1 = 2
33—8	57	99	передняго края глаза	1 = 2
34—9	65	99	задняго края глаза	1 = 2
35—10	64	103	почти конца рыльца	1 = 2
36—11	53	87	передняго края глаза	1 > 2

III. Голова, спина, бока и наружная поверхность ногъ матовочернаго цвѣта; срединная и боковая свѣтлыя полосы, характерныя экземплярѣмъ обоихъ предыдущихъ группъ, здѣсь сильно затемнѣны. Подчелюстная область, брюхо и внутренняя поверхность ногъ свѣтлосѣрыя (только у № 40 брюхо желтоватое), покрытыя рѣзко очерченными черными пятнышками. — Рыльце тупое.

37—1	54	89	передняго края глаза	1 = 2
38—2	32	51	конца рыльца	1 < 2
39—3	32	46	задняго края глаза	1 < 2
40—4	45	78	передняго края глаза	1 = 2
41—5	60	90	задняго края глаза	1 < 2

Красная окраска, въ видѣ пятнышекъ, на спинѣ, брюхѣ, бедрахъ, при жизни была гораздо интенсивнѣе, чѣмъ послѣ трехмѣсячнаго пребыванія въ спиртѣ, когда у большинства (первая группа) эти пятна оказались уже совсѣмъ незамѣтными. Въ свѣжемъ же состояніи они отсутствовали лишь у немногихъ.

Дифференціальная діагностика между *Rana arvalis* Nilss. и *Rana muta* Laur. основана на слѣдующихъ признакахъ:

Rana arvalis.

1. Рыльце острое.
2. У задней границы головы находится темнобуряя фигура (пятно), въ видѣ буквы Δ, вершиной обращенная впередъ.
3. Ширина вѣка болѣе ширины промежутка между вѣками.

Rana muta.

- Рыльце тупое.
На затылкѣ темнобураго пятна не бываетъ. (Кащенко).
Ширина вѣка равна ширинѣ промежутка между вѣками. (Никольскій).

Rana arvalis.

Rana muta.

4. Брюшко чисто бѣлое.

Брюшко покрыто сѣрыми и красноватыми пятнами.

(Кащенко).

5. Бугорокъ у основанія внутренняго пальца задней ноги (внутренній метатарсальный или пяточный) сильно развитъ; длина его больше половины длины этого пальца.

Внутренній метатарсальный бугоръ задней ноги слабо развитъ, его длина не болѣе $\frac{1}{3}$ длины соотвѣтственнаго пальца.

6. Пяточное сочлененіе вытянутой впередъ задней ноги доходитъ — до середины или задняго края глаза.

— до конца рыльца.

7. Утолщеніе на большомъ пальцѣ передней лапки у самцовъ — цѣльное

— распадается на 4 части.

Изученіе данной коллекціи даетъ основаніе сдѣлать слѣдующія замѣчанія:

1. Конечъ рыльца у обоихъ видовъ представляется въ различной степени острымъ или тупымъ, почему этотъ признакъ не всегда можетъ служить признакомъ вида.
2. Темное Δ -образное пятно у *arvalis* рѣдко отсутствуетъ или слабо замѣтно (№№ 7 и 10).
3. Промежутокъ между вѣтками по отношенію ширины вѣкъ — недостаточно надежный признакъ для различенія видовъ, такъ какъ измѣряемая часть не имѣютъ опредѣленныхъ границъ, и отъ сдавленія спиртовыхъ препаратовъ въ перевозочныхъ банкахъ эти границы становятся и вовсе неопредѣленными. Въ отдѣльныхъ случаяхъ, правда, этотъ признакъ могъ служить пособіемъ при опредѣленіи вида.
4. Случай сѣрыхъ пятнышекъ на брюшкѣ *arvalis* рѣдки (№№ 1 и 11), почему бѣлое брюшко этого вида является признакомъ сравнительно болѣе надежнымъ.
5. Внутренній пяточный бугоръ у *arvalis* во всѣхъ случаяхъ сильно выраженъ; сжатый съ боковъ, онъ представляется въ видѣ высокаго валика или гребешка. У *muta* пяточный бугоръ всегда слабо развитъ.

6. Пяточное (тибіо-тарсальное) сочлененіе при вытянутой ногѣ доходить у —

	<i>arvalis</i>	<i>muta</i>
до конца рыльца	4 экз.	12 экз.
до передняго края глаза	9 „	15 „
до задняго края глаза	4 „	14 „

7. Утолщеніе на большомъ пальцѣ передней лапки у самцовъ обоихъ видовъ одинаково распадается болѣе или менѣе на двѣ части.

8. Первый и второй пальцы передней лапки у *arvalis* въ 7 случаяхъ равны по длинѣ, въ 9 — первый больше второго и въ одномъ — второй больше перваго (3-й случай). — У *muta*: первый и второй равны въ 22 случаяхъ, первый больше — въ 5 случаяхъ и второй больше перваго — въ 14 случаяхъ. Къ этому считаю нелишнимъ прибавить, что

1) третій палецъ самый длинный, 2-й и 4-й почти равны.

2) Плавательная перепонка на заднихъ лапкахъ у представителей обоихъ видовъ прикрѣплена у основанія 2-ой фаланги на 4-мъ, самомъ длинномъ пальцѣ, на остальныхъ — у основанія конечной фаланги.

Въ ближайшихъ окрестностяхъ станціи Иланской лягушки встрѣчаются во множествѣ, причемъ, какъ видно, чаще попадаетъ *muta* (41 экз. или 70,68% общаго числа) и сравнительно рѣже *arvalis* (17 экз. или 29,31% общаго числа). Оба вида живутъ вмѣстѣ, при одинаковыхъ условіяхъ и, вѣроятно, даютъ помѣси, сближающія по тому или другому признаку отдѣльные экземпляры съ тѣмъ или другимъ видомъ. Поэтому отдѣльно взятый признакъ для различенія представителей того или другаго вида среди иланскихъ лягушекъ оказывается, какъ видно изъ вышеизложенныхъ замѣчаній, не вполне надежнымъ, кромѣ одного — внутренняго метатарсальнаго бугорка задней ноги, который рѣзко выраженъ у *arvalis* и слабо у *muta*.

4. *Bufo vulgaris* LAUR.

По даннымъ, имѣющимся у А. М. Никольскаго, сѣрая жаба встрѣчается по всей Сибири, на востокъ вплоть до о. Сахалина включительно; въ восточной Сибири ее встрѣчали около

г. Иркутска, озера Байкала и проч., но на Канскій уѣздъ, Енисейской губ., указаній нѣтъ ⁶⁾).

Въ ближайшихъ окрестностяхъ ст. Иланской сѣрая жаба мнѣ ни разу не попадалась, несмотря на тщательные поиски. Имѣющійся экземпляръ сѣрой жабы доставленъ былъ мнѣ I. В. Чапскимъ 25 іюня. Эта жаба была взята на берегу р. Кана, верстахъ въ 15 отъ станціи.

Жаба — ♀, сверху грязнобураго цвѣта, снизу (брюшко) желтоватаго съ черными и свѣтлосѣрыми пятнами. Длина тѣла (отъ передняго конца головы до заднепроходнаго отверстія) 53 mm., длина задней ноги 61 mm. Задняя нога, вытянутая впередъ, плюсно-предплюсневымъ сочлененіемъ достигаетъ только до основанія передней ноги, что характерно для самокъ этого вида. — Первый внутренній палецъ переднихъ ногъ равенъ по длинѣ второму; внутренній пяточный бугоръ вдвое больше наружнаго пяточнаго.

Длина головы 12 mm., ширина головы 18 mm., высота головы 8,5 mm., длина паротидъ 9 mm., ширина — 3,5 mm.

II. Reptilia.

1. *Lacerta vivipara* JACQ.

Живородящая ящерица, по даннымъ у А. М. Никольскаго, встрѣчается на всемъ пространствѣ Сибири, вплоть до о. Сахалина включительно, хотя въ частности для Канскаго уѣзда она не указана ⁷⁾. Подлѣ ст. Иланской эта ящерица встрѣчалась обыкновенно на высокой сухой мѣстности, подъ гнилыми лѣсинами. Собрано 14 экземпляровъ разнаго возраста: 5 экз. молодыхъ и 9 взрослыхъ.

Молодые — темнобураго цвѣта съ металлическимъ отливомъ; вдоль средины спины имѣется черная полска, по сторонамъ которой находятся бѣлыя пятнышки; брюшко зеленовато-голубое.

№	Размѣры и число чешуй.				
	1	2	3	4	5
Длина всего тѣла	47	73	84	81	98
„ туловища	23	34	36	33	40
„ хвоста	24	39	48	48	58
Воротничковыхъ чешуй . . .	8	8	12	9	8
Рядовъ брюшныхъ чешуй . .	8	6	6	6	6

6) Никольскій, А. М. — Loco citato. Стр. 393.

7) Loco citato. Стр. 122—123.

Размѣры и число чешуй и бедряныхъ поръ у взрослыхъ экземпляровъ:

№№	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Длина тѣла.	130	114	123	132	149	143	113	122	105
„ туловища	50	54	65	64	65	60	65	64	62
„ хвоста.	80	60	58	68	84	83	48	58	43
Воротничковыхъ чешуй	8	10	8	8	9	7	9	7	7
Рядовъ спинныхъ „	31	29	35	30	28	32	32	28	29
„ брюшныхъ „	6	8	8	8	6	6	8	8	6
Бедряныхъ поръ . . .	9/9	8/10	10/10	10/10	9/9	11/11	11/9	10/11	11/11

У №№ 3 и 9 хвостъ регенерированъ.

Относительно окраски экземпляры неодинаковы:

№ 1. Спина свѣтлоричневая, бока темнѣе. Вдоль спины черная полоска, по сторонамъ разсѣяны темныя пятна. На границѣ спины и боковъ желтоватая полоска. Брюшко зеленоватое.

№ 2. Спина темнофіолетовая; брюшко свѣтлофіолетовое.

№ 3. Самка, при вскрытіи обнаружено семь зародышей.— Спина свѣтлозеленоватая съ тремя темнокоричневыми продольными полосами; бока темнокоричневые; брюшко зеленоватое.

№ 4. Самка.— Спина такого же цвѣта, какъ у предыдущей, только вмѣсто продольныхъ полосъ здѣсь ряды овальныхъ пятенъ. Брюшко желтовато-зеленоватое, а по снятіи верхняго слоя чешуекъ бронзо-фіолетовое съ черными точками.

№ 5. Самка.— Спина темнозеленая, по срединѣ продольная темная полоса, по сторонамъ свѣтлозеленая. Брюшко зеленое.

№ 6. Самка.— Спина темнозеленовато-бурая, по срединѣ ея темная полоска. Брюшко зеленоватое.

№ 7. Цвѣтъ спины какъ у предыдущей. Брюшко желтовато-зеленое, съ черными точками.

№ 8. Самка.— Спина темнозеленая съ двумя боковыми свѣтлыми полосами, по обѣ стороны которыхъ проходятъ черныя пятна; по срединѣ спины продольный рядъ черныхъ пятенъ. Брюшко фіолетовое.

№ 9. Самка.— Окраска, какъ у предыдущей, общій фонъ нѣсколько свѣтлѣе, почему черныя пятна выступаютъ рѣзче.

По г. Никольскому брюшные щитки у живородящей ящерицы располагаются въ 6—8 продольныхъ рядовъ⁸⁾. Также и у планскихъ пришлось отмѣтить то 6, то 8 рядовъ брюшныхъ щитковъ. Колебаніе цифръ зависитъ отъ того, что щитки на

8) Указ. соч., стр. 119.

границѣ брюшной и спинной поверхностей у однихъ экземпляровъ оказываются мелкими, сходными со спинными, у другихъ же болѣе крупными, сходными болѣе съ брюшными, чѣмъ со спинными.

2. *Lacerta agilis* L. var. *altaica* KASTSCHENKO.

А. М. Никольскій, находя, что „во всякомъ случаѣ свѣдѣнія о распространеніи *Lacerta agilis* на востокъ далѣе Енисея нельзя считать вполне точными“, заключаетъ, что „восточной границей этого вида надо считать р. Енисей“⁹⁾.

Какъ сказано выше, прыткая ящерица встрѣчается въ 4-хъ верстахъ отъ ст. Иланской, на мельницѣ купца Севрунова и въ прилегающемъ къ ней березовомъ колкѣ: за короткое время здѣсь было взято 89 экземпляровъ. Такая находка расширяетъ область распространения этой рептилии на востокъ за указанные предѣлы: ст. Иланская отстоитъ отъ р. Енисея восточнѣе не менѣе какъ на 150 верстъ.

Иланскія прыткія ящерицы представляютъ въ общемъ такія же особенности, отличающія ихъ отъ типичной формы и ея var. *exigua* EICHW., какія наблюдаются у алтайскихъ изъ окрестностей с. Чемала: 1) у большинства взрослыхъ, при болѣе темной окраскѣ, замѣчается темная спинная полоса, свойственная молодымъ особямъ, и три свѣтлыя спинныя полосы, — и 2) увеличеніе числа носовыхъ щитковъ до 4-хъ и болѣе. Такія особенности дали основаніе профессору Н. Θ. Кащенко отличить алтайскихъ ящерицъ изъ его сбора 1898 года отъ типичной формы подъ названіемъ var. *altaica*¹⁰⁾. Слѣдующія таблицы измѣреній и описанія показываютъ, что область распространения var. *altaica* не ограничивается Алтаемъ.

I. Съ двумя носовыми щитками съ каждой стороны.
4 экз. или 4,5%.

№№	Д	л	и	н	а	Рядовъ чешуй	Воротничк.	Бедряныхъ
	тѣла.	туловища.	хвоста.	спинныхъ.	чешуй.	поръ.		
1	199	83	116	48	10	15—14		
2	192	76	117	52	11	12—14		
3	108	43	65	43	10	14—14		
4	108	80	28	57	10	14—14		

9) Loco citato, стр. 112, 113.

10) Кащенко, Н. Θ. — „Результаты алтайской зоологической экспедиціи 1898 года“. Извѣстія Имп. Томскаго универс. 1899. Стр. 118—119.

Ежегодн. Зоол. Муз. 1911.

№ 1. — ♂, зеленый; свѣтлыя полосы слабо выражены. Преанальных щитка три, средней величины.

№ 2. — Свѣтлыя полосы выражены. Преанальные, какъ у *exigua*.

№ 3. — Темныя и свѣтлыя полосы. Преанальные, какъ у *exigua*.

№ 4. — ♂, зеленый; полосы выражены слабо. Преанальных щитка три, боковой больше другихъ.

Справа 3, слѣва 2 носовыхъ щитка.

1 экз. или 1,1%.

№ 5. — Длина тѣла 116, туловища 45, хвоста 71; рядовъ чешуй 44, воротничковыхъ — 11, бедряныхъ поръ 13—14. — Полосы выражены рѣзко. Преанальные щитки средней величины.

Эти пять экземпляровъ представляютъ *var. exigua* Eichw.

II. По 3 носовыхъ щитка съ каждой стороны.

18 экз. или 20,2%.

№№	Д л и н а			Рядовъ чешуй спинныхъ.	Воротничк. чешуй.	Бедряныхъ поръ.
	тѣла.	туловища.	хвоста.			
6	161	66	95	41	9	14—14
7	153	75	78	52	11	14—14
8	166	68	98	55	11	15—14
9	170	67	103	45	10	14—14
10	190	74	116	50	11	14—14
11	129	61	68	45	12	13—13
12	160	60	100	50	10	12—15
13	140	67	73	44	12	15—15
14	151	77	74	51	11	12—11
15	186	82	104	45	11	13—12
16	189	76	113	57	11	14—15
17	157	65	92	46	10	12—13
18	189	80	109	48	11	15—14
19	180	68	112	47	10	15—14
20	187	73	114	54	10	12—12
21	195	88	107	47	10	15—14
22	188	76	111	47	11	12—13
23	143	68	75	43	11	13—12

№ 6. — Слѣва большой предглазничный (скуло-челюстный) щитокъ раздѣленъ на верхній и нижній. — Коричневаго цвѣта съ темными полосами. Преанальные, какъ у *exigua*.

№ 7. — Свѣтло-коричневая съ темно-бурыми пятнами. Преанальные, какъ у *exigua*.

№ 8. — Вдоль спины двѣ темныя сплошныя полосы. Передъ анальнымъ щиткомъ одна большая чешуйка задняго полу-круга.

№ 9. — На спинѣ три свѣтлыя полосы. Анальный щитокъ раздѣленъ поперекъ на два; преанальные, какъ у *exigua*.

№ 10. — ♂ зеленый; полосы слабо выражены. Преанальные, какъ у *exigua*.

№ 11. — Свѣтлыя спинныя полосы выражены слабо. Преанальные, какъ у *exigua*. — Хвостъ регенерировалъ.

№ 12. — Лобно-носовой щитокъ раздѣленъ вдоль на два неравныхъ, — правый больше. Передне-внутренніе углы предлобныхъ щитковъ отдѣлены въ самостоятельныя щитки. — Спинныя полосы рѣзки. Преанальныхъ щитка три, средней величины.

№ 13. — Свѣтлыя полосы рѣзки. Преанальные, какъ у *exigua*.

№ 14. — Тоже, что у предыдущей. — Хвостъ регенерированъ.

№ 15. — Свѣтлыя полосы и ряды черныхъ пятенъ. Преанальныхъ три щитка.

№ 16. — Полосы слабы. Преанальные, какъ у *exigua*.

№ 17. — Полосы рѣзки. Преанальные, какъ у *exigua*.

№ 18. — ♀, ошупываются яйца. — Срединная спинная полоса рѣзко выражена. Преанальные, какъ у *exigua*.

№ 19. — Полосы выражены слабо. Преанальные, какъ у *exigua*.

№ 20. — ♂ зеленый, полосы слабы. Преанальныхъ щитка два средней величины.

№ 21. — ♀ съ яйцами. — Слѣва передній носовой щитокъ не вполне раздѣленъ бороздкой на два. Задній отдѣлъ предлобнаго щитка слѣва распался на шесть чешуекъ. — Полосы ясныя. Преанальные щитки, какъ у *exigua*.

№ 22. — ♀, полосы рѣзки. Преанальные щитки, какъ у *exigua*.

№ 23. — Тоже, что у предыдущей.

Съ одной стороны 3 носовыхъ щитка, съ дугой 4.

8 экз. или 8,9%.

№№	Д л и н а			Рядовъ чешуй спинныхъ.	Воротнич. чешуй.	Бедряныхъ поръ.
	тѣла.	туловища.	хвоста.			
24	182	72	110	45	11	14—13
25	175	75	100	47	10	14—12
26	160	60	100	43	13	13—13
27	172	70	102	40	11	13—14
28	178	70	108	46	12	14—12
29	165	75	90	53	10	12—11
30	172	73	99	42	10	15—14
31	173	78	95	49	10	14—13

№ 24. — ♂, зеленый. — Справа верхній носовой щитокъ занимаетъ часть предлобнаго, слѣва на предлобномъ, соотвѣтственно положенію праваго 4-го щитка, находится поперечная трещина. При сравненіи обѣихъ сторонъ получается впечатлѣніе, какъ будто слѣва 4-й щитокъ неполнѣ сросся съ предлобнымъ. — Преанальные щитки, какъ у *exigua*.

№ 25. — ♂, зеленый, три бѣлыхъ спинныхъ полосы. — Четвертый носовой щитокъ слѣва. — Передъ анальнымъ щиткомъ три полукруга чешуекъ, тотчасъ впереди этого щитка одна чешуйка.

№ 26. — ♂. — Четвертый носовой справа. Срединная свѣтлая полоса выражена, боковыя слабо. Преанальные, какъ у *exigua*.

№ 27. — Четвертый носовой справа. — Свѣтлыя полосы ясны. — Преанальные, какъ у *exigua*.

№ 28. — ♂, зеленый, съ тремя свѣтлыми полосами. — Четвертый носовой слѣва, образованъ насчетъ предлобнаго. Преанальные, средней величины.

№ 29. — ♂, темно-зеленый, свѣтлыя полосы выражены слабо. — Четвертый носовой справа. Третій верхнегубной щитокъ раздѣленъ поперекъ. Преанальные, какъ у *exigua*.

№ 30. — Четвертый носовой слѣва. Полосы рѣзки, преанальные — средніе.

№ 31. — Четвертый носовой справа. Полосы рѣзки. Преанальные, какъ у *exigua*.

По числу носовыхъ щитковъ эта группа относится къ типичной формѣ. Здѣсь наблюдается дѣленіе щитковъ: скуло-

челюстного, лобно-носового, предлобного, верхнегубного, носоваго. Дѣленіе предлобного по сосѣдству съ носовыми обуславливаетъ явленіе четвертаго носоваго щитка. Преанальные щитки чаще расположены какъ у *exigua*, т. е. передъ анальнымъ щиткомъ расположено два полукруга чешуекъ, причемъ двѣ среднія задняго полукруга больше другихъ.

III. По 4 носовыхъ щитка съ каждой стороны.

39 экз. или 43,8%.

№№	Д л и н а.			Рядовъ чешуй спинныхъ.	Воротничк. чешуй.	Бедряныхъ поръ.
	тѣла.	туловища.	хвоста.			
32	195	85	110	47	11	14—14
33	148	87	60	48	10	14—14
34	169	65	104	52	12	13—14
35	170	65	105	46	11	13—13
36	178	70	108	55	9	13—12
37	170	70	100	50	9	13—13
38	164	68	96	42	11	12—13
39	162	68	94	44	10	13—14
40	190	80	110	46	12	13—13
41	172	80	92	47	11	14—14
42	152	68	84	44	8	13—13
43	172	76	96	46	11	10—12
44	168	76	92	43	10	13—13
45	162	72	90	44	10	13—13
46	148	75	73	48	10	15—14
47	135	75	60	44	11	12—13
48	124	75	59	46	10	10—12
49	175	72	103	43	11	12—13
50	150	70	80	48	10	12—15
51	201	78	123	49	11	13—14
52	163	85	78	49	9	15—15
53	142	78	64	47	10	14—13
54	191	78	113	50	9	14—14
55	128	66	62	46	9	11—11
56	183	72	111	46	11	15—14
57	169	69	100	40	10	12—13
58	178	73	105	46	11	13—12
59	155	75	80	49	12	15—13
60	173	65	108	50	12	14—13
61	174	66	108	44	10	15—14
62	187	72	115	49	12	13—13
63	168	65	103	45	11	15—15
64	187	77	110	44	8	14—13

№№	Д л и н а			Рядовъ чешуй	Воротчикъ.	Бедряныхъ
	тѣла.	туловища.	хвоста.	спинныхъ.	чешуй.	поръ.
65	150	65	85	48	11	14—12
66	95	51	44	46	11	12—13
67	162	75	77	45	10	13—14
68	—	80	—	49	10	12—14
69	100	47	63	49	10	12—15
70	—	65	—	40	10	13—15

№ 32. — ♀. — Спина желтоватая съ темно-коричневыми пятнами; брюшко свѣтло-желтое съ черными пятнышками. Преанальные щитки, какъ у *exigua*.

№ 33. — ♂. Спина желтовато-зеленоватая съ черными пятнышками, брюшко зеленоватое съ черными пятнышками. Преанальные, какъ у *exigua*.

№ 34. — ♂. По зеленоватому фону коричневые пятна и полосы. Преанальные, какъ у *exigua*.

№ 35. — Свѣтло-коричневая съ темнотурными пятнами. Преанальные, какъ у *exigua*.

№ 36. — Окраска и преанальные, какъ у предыдущей.

№ 37. — Полосы выражены. Впереди анального щитка въ заднемъ полукругѣ чешуекъ находится одна чешуйка, по величинѣ меньше сосѣднихъ.

№ 38. — ♂, зеленый, выражена срединная свѣтлая полоска. Преанальные, какъ у *exigua*.

№ 39. — На спинѣ выражена срединная свѣтлая полоска. — Преанальные, какъ у *exigua*.

№ 40. — ♀, въ полости брюха ощупываются яйца. — На спинѣ три свѣтлыя полосы. Преанальные, какъ у *exigua*.

№ 41. — ♀, съ пятью яйцами въ брюшной полости. На спинѣ черныя пятна. Преанальные, какъ у *exigua*.

№ 42. — Три свѣтлыя спинныя полосы. Преанальные обычны.

№ 43. — ♀ съ яйцами. — Срединная свѣтлая полоска. Преанальные обычны.

№ 44. — Тоже, какъ у предыдущей.

№ 45. — ♂. Тоже, какъ у предыдущей.

№ 46. — ♂; три свѣтлыя полосы. Въ заднемъ преанальномъ полукругѣ чешуй одинъ большой щитокъ.

№ 47. — Три свѣтлыя полосы. Преанальные обычны.

№ 48. — ♀ съ яйцами. — Тоже, какъ у предыдущей.

№ 49. — Въмѣсто полосокъ свѣтлыя пятна. Преанальные обычные.

№ 50. — ♂ зеленый, свѣтлыя полосы неясны. Преанальные обычные.

№ 51. — ♂, яркозеленый. Полосы слабы. Преанальныхъ три щитка.

№ 52. — Тоже, какъ у предыдущей.

№ 53. — Тоже, какъ у предыдущей.

№ 54. — Три преанальныхъ полукруга; щитки малы.

№ 55. — Темныя и свѣтлыя полосы рѣзки. Три преанальныхъ щитка. Слева 3-й верхнегубной раздѣленъ поперекъ на два щитка.

№ 56. — ♂ зеленый, полосы неясны. — Лобно-носовой щитокъ раздѣленъ на четыре щитка, изъ коихъ одинъ больше. — Преанальныхъ два.

№ 57. — Полосы ясны. Преанальныхъ щитка три.

№ 58. — ♀. — Полосы рѣзки. Преанальныхъ щитка два, средней величины.

№ 59. — ♀, съ яйцами. Полосы ясны. Преанальные щитки обычные.

№ 60. — ♂, полосы неясны. Три преанальныхъ полукруга.

№ 61. — ♀. Свѣтлыя полосы на спинѣ, бѣлыя пятна на бокахъ. Преанальные щитки обычные.

№ 62. — ♂, срединная свѣтлая полоса. Преанальные обычные.

№ 63. — Полосы рѣзки; преанальные обычные.

№ 64. — Тоже, что у предыдущей.

№ 65. — Полосы ясны. Лобно-носовой раздѣленъ на два ровныхъ щитка. Преанальный щитокъ одинъ большой.

№ 66. — Полосы рѣзки. Преанальныхъ щитка два, большіе, занимаютъ средину обоихъ полукруговъ чешуй.

№ 67. — ♀. Полосы ясны, преанальные щитки обычные.

№ 68. — Полосы ясны, — преанальный одинъ, большой.

№ 69. — Полосы рѣзки. Преанальные, какъ у *exigua*.

№ 70. — Справа 1 и 2 верхнегубные раздѣлены поперекъ каждый на два щитка. — Полосы рѣзки. Преанальныхъ щитка три большихъ.

Въ этой группѣ, какъ правило, наблюдается увеличеніе носовыхъ щитковъ до 4-хъ насчетъ предлобныхъ; гораздо

рѣже наблюдается дѣленіе верхнегубныхъ (2 сл.) и лобно-носовыхъ (2 случая).

IV. Справа 5, слѣва 3 носовыхъ щитка.

1 экз. или 1,1%.

№ 71. — ♀ съ 5-ю яйцами. Длина тѣла 178, туловища 75, хвоста 103; рядовъ чешуй 45, воротничковыхъ 12, бедряныхъ поръ 14—15. — Справа 5 носовыхъ щитковъ, изъ нихъ два верхніе образованы насчетъ лобно-носового и праваго предлобнаго щитковъ. — Три свѣтлыя полосы на спинѣ. Преанальнымъ щиткомъ одна чешуйка задняго полукруга.

V. Съ одной стороны 4, съ другой 5 носовыхъ щитковъ.

7 экз. или 7,8%.

№№	Д л и н а			Рядовъ чешуй	Воротничк.	Бедряныхъ
	тѣла.	туловища.	хвоста.	спинныхъ.	чешуй.	поръ.
72	174	74	100	51	9	13—14
73	—	85	—	46	11	13—11
74	190	81	109	45	10	10—12
75	179	78	101	42	11	14—15
76	—	84	—	47	8	15—14
77	—	64	—	48	11	13—14
78	182	78	104	49	10	13—14

№ 72. — ♂. Справа 5 носовыхъ щитковъ. Желтовато-зеленоватаго цвѣта съ черными пятнами; брюшко зеленоватое съ черными пятнышками. Преанальные щитки, какъ у *exigua*.

№ 73. — ♀, коричневая. Слева 5 носовыхъ; наблюдается надростральный щитокъ. Преанальные щитки обычны.

№ 74. — Слева 5 носовыхъ, при чемъ 5 образованъ насчетъ лобно-носового щитка. — Полосы ясны, преанальные обычны.

№ 75. — Слева 5 носовой отдѣленъ отъ носо-межчелюстного. Полосы ясны. Передъ анальнымъ щиткомъ одна чешуйка.

№ 76. — Слева 5 носовой образованъ насчетъ лобно-носового. На спинѣ три свѣтлыя полосы. Преанальные обычны.

№ 77. — Справа 1-й и 2-й верхнегубные щитки раздѣлены поперекъ на 4; слева отъ 2 верхнегубнаго сверху отдѣленъ

маленькій щитокъ; — считая послѣдній за носовой, слѣва такихъ будетъ 5. — Полосы рѣзки. Преанальныхъ три щитка. Хвостъ регенерированъ.

№ 78. — ♂, темно-зеленый, полосы неясны. Слева между вторымъ и третьимъ верхнегубными щитками вклинивается 5-й носовой. — Преанальныхъ щитка три.

Въ этой группѣ изъ 7 экз. 5-й носовой щитокъ образованъ насчетъ лобно-носового въ двухъ случаяхъ, — верхнегубныхъ также въ двухъ случаяхъ и въ одномъ — насчетъ носо-межчелюстного. Въ остальныхъ двухъ случаяхъ образование 5-го щитка необходимо отнести насчетъ дѣленія носовыхъ щитковъ. Въ одномъ случаѣ наблюдается появленіе надростральнаго щитка.

VI. По 5 носовыхъ щитковъ съ каждой стороны.

5 экз. или 5,6%.

№№	Д л и н а			Рядовъ чешуй	Воротничк.	Бедряныхъ
	тѣла.	туловища.	хвоста.	спинныхъ.	чешуй.	поръ.
79	176	79	97	50	10	15—15
80	—	79	—	51	11	14—13
81	166	70	96	40	8	13—14
82	151	73	78	48	10	13—14
83	—	85	—	52	11	16—11

№ 79. — ♀. — Пятые носовые щитки на обѣихъ сторонахъ вклиниваются между 2 и 3 верхнегубными. — Полосы неясны. Преанальные щитки обычны.

№ 80. — Полосы ясны. Впереди анальнаго щитка двѣ большія чешуйки задняго полукруга.

№ 81. — ♂, темно-зеленый, полосы слабы. — Между носо-межчелюстными находятся два маленькихъ щитка, одинъ позади другаго. Лобно-носовой раздѣленъ на два парныхъ щитка, позади которыхъ вклинивается маленькій непарный. — Преанальные щитки обычны.

№ 82. — ♀ съ яйцами. Три свѣтлыя спинныя полосы. Преанальные какъ у *exigua*.

№ 83. — ♀ съ яйцами. Тоже, что у предыдущей.

Въ этой группѣ только въ одномъ случаѣ 5-й носовой образованъ насчетъ верхнегубныхъ.

VII. Число носовых щитковъ свыше 5 на одной или обѣихъ сторонахъ.

6 экз. или 6,7%.

№№	Число носов. щитковъ.	Д тѣла.	л тулов.	и хвоста.	а Рядовъ чешуй.	Воротн. чешуй.	Бедряныхъ поръ.
84	5—6	169	68	101	43	9	13—13
85	5—6	181	76	105	41	11	15—13
86	5—6	162	70	92	48	10	13—13
87	5—7	150	67	83	49	10	12—13
88	6—6	193	86	107	46	12	15—13
89	9—9	177	70	107	49	11	15—14

№ 84. — ♂, темно-зеленый. — Лобно-носовой щитокъ раздѣленъ наискось на два, правый и лѣвый. — Преанальные щитки обычны.

№ 85. — ♂. Лобно-носовой раздѣленъ на два парныхъ. — Полосы слабы. Преанальные, какъ у *exigua*.

№ 86. — Наблюдается надростральный круглый щитокъ. — Полосы видны. Преанальные щитки средніе.


№ 87. — Справа предглазничный щитокъ раздѣленъ поперекъ на два; слѣва 3-й верхнегубной раздѣленъ поперекъ на два; если верхній изъ послѣднихъ щитковъ считать за носовой, то слѣва будетъ семь носовыхъ. — Свѣтлыя спинныя полосы. Преанальныхъ три щитка.

№ 88. — ♀ темно-коричневая съ темно-бурыми пятнами. Преанальные щитки небольшіе.

№ 89. — ♂ зеленый, три свѣтлыя полосы. — Носовые щитки расположены на подобіе височныхъ, т. е. въ центрѣ находится болѣе крупный щитокъ. У этого же экземпляра наблюдается надростральный щитокъ. — Преанальные щитки какъ у *exigua*.

Только у № 88 не наблюдается дѣленія нормальныхъ щитковъ, у остальныхъ или дѣленіе: лобно-носоваго, предглазничнаго, верхнегубныхъ, — или появляется сверхкомплектный — надростральный щитокъ (№№ 86 и 89).

Описанная коллекція иланскихъ прыткихъ ящерицъ по числу носовыхъ щитковъ представляетъ такое же разнообразіе, какъ и коллекція чемальскихъ (алтайскихъ), при чемъ какъ и



Объясненіе рисунковъ.

Фиг. 1. — Голова *Lacerta agilis altaica*, сбоку: 4 носовыхъ щитка. — Со станціи Иланской, іюнь 1910 г. Описана подъ № 40.

Фиг. 2. — Тоже, съ 5-ю носовыми щитками. — Со станціи Иланской, іюнь 1910 г. — № 80.

Фиг. 3. — Тоже, съ 7-ю носовыми щитками. — Изъ окрестностей с. Чемала, на Алтаѣ, іюнь 1909 г. — Описана въ статьѣ, «Научные результаты командировки въ окрестности с. Чемала, на Алтаѣ, въ 1909 г.» — «Ежегодникъ Зоолог. музея Имп. Академіи Наукъ». Т. XV. 1910. Стр. 316.

Фиг. 4. — Тоже, съ 9-ю носовыми щитками. — Со станціи Иланской, іюнь 1910 г. Описана подъ № 89.

Фиг. 5. — Голова ящерицы съ 7-ю носовыми щитками, сверху; а — надростральный щитокъ.

Увеличеніе $\frac{2}{1}$.