

## LE LÉZARD DES SOUCHES

*Lacerta agilis* Linné, 1758

Autre nom français : Lézard agile

### DESCRIPTION

Le Lézard des souches est un lézard de taille moyenne : jusqu'à 27 cm queue comprise. Celle-ci est relativement courte (1,25 à 1,7 fois la longueur totale de l'animal).

Le Lézard des souches est trapu, avec une tête forte et courte. Ses pattes sont hautes et robustes. Généralement plus grande, la femelle est entièrement brune, avec des ocelles clairs et des taches foncées sur les flancs. Le mâle est vert sauf le dos, qui est brun. Le juvénile est brun clair à grisâtre avec des ocelles blancs cernés de noir bien distincts.



### BIOLOGIE

La période d'activité débute à partir de mi-mars et s'achève entre septembre et début octobre. Le Lézard des souches est diurne, il passe la majeure partie de son temps à chasser et à prendre le soleil. Lors des chaudes journées d'été, il passe une partie de la journée dans son gîte.

La saison de reproduction débute fin avril ou début mai. Les accouplements ont lieu généralement en mai, et les pontes de fin mai jusqu'au mois de juillet (en juin le plus souvent). Une deuxième ponte peut avoir lieu en juillet, 4 à 6 semaines après la première. Chaque ponte contient de 4 à 14 œufs. Ils sont enfouis dans le sol meuble ou cachées sous une pierre. Les jeunes lézards éclosent 6 semaines à trois mois plus tard, soit en général entre fin juillet et septembre (souvent en août).

La maturité sexuelle est acquise entre 1 et 2 ans pour le mâle, et 3 à 4 ans pour la femelle. La longévité maximale connue est de 12 ans.

Le régime alimentaire est composé de toutes sortes d'insectes (criquets, coléoptères, papillons, fourmis...) et d'arachnides.

### HABITATS

Le Lézard des souches apprécie les milieux buissonneux et bien ensoleillés comme les landes, les friches, les lisières et les haies bien exposées. On le retrouve également dans des milieux plus artificiels comme les talus routiers, les voies de chemins de fer et les carrières, ou dans des milieux plus humides comme les tourbières.

### RÉPARTITION

L'aire de répartition du Lézard des souches recouvre la majeure partie de l'Europe du nord jusqu'à la moitié sud de la Suède. Au sud, il est plus rare, voire même absent dans les zones méditerranéennes. En France, il est absent de l'ouest, du sud-ouest et du sud-est méditerranéen. En Île-de-France, il est rare, plus présent au nord qu'au sud de la région. Bien qu'il ait pu y être présent, le Lézard des souches n'a jamais été mentionné en Seine-Saint-Denis. Il pourrait y être encore.