

ÜBERSICHT DER ARTEN UND UNTERARTEN DER FAMILIE LACERTIDAE

1. Nachtrag

WOLFGANG BISCHOFF

Mit diesem ersten Nachtrag soll die Übersicht über die Lacertiden-Arten und -Unterarten fortgesetzt und auf den neuesten Stand gebracht werden, wie ich es im letzten Teil der Übersicht angekündigt habe (BISCHOFF 1992). So muß die Liste der Gattung *Eremias* (BISCHOFF 1991a) um die zwei neuen Taxa *E. afghanistanica* und *E. multiocellata szczerbaki* (vgl. BÖHME & SCHTSCHERBAK 1991, JERIOMTSCHENKO, PANFILOW & ZARINENKO 1992) und die revalidierte Unterart *E. multiocellata stummeri* (vgl. JERIOMTSCHENKO, PANFILOW & ZARINENKO 1.c.) ergänzt werden. Drei weitere Taxa erweitern die Gattung *Lacerta*. Neubeschreibungen sind die Unterarten *L. rudis chechenica* und *L. valentini spitzenbergerae* (vgl. EISELT & DAREWSKIJ 1991, EISELT, DAREWSKIJ & SCHMIDTLER 1992), wobei *L. r. chechenica* der bei BISCHOFF (1991b: 11) erwähnten *L. rudis* ssp. entspricht. Bei *L. lepida iberica* handelt es sich wieder um ein revalidiertes synonym (vgl. MATEO & CASTROVIEJO 1991).

Eremias WIEGNANN, 1834 [Wüstenrenner]
(*Eremias* s.str.)

E. afghanistanica BÖHME & SCHTSCHERBAK, 1991
Afghanistan (Südost-Abfall des Hindukusch).

(*Pareremias* SCHTSCHERBAK, 1973)

E. multiocellata stummeri WETTSTEIN, 1940

Kirgistan (Issyk-Kul-Gebiet), Kasachstan (Naryn-Steppe) und angrenzendes Gebiet von China.

E. multiocellata szczerbaki JERIOMTSCHENKO, PANFILOW & ZARINENKO, 1992

Kirgistan (Tal des Flusses Arpa).

Lacerta LINNAEUS, 1758 [Halsbandeidechsen]

(*Apathya* s.l.) [Felseidechsen]

L. rudis chechenica EISELT & DAREWSKIJ, 1991

Russland, Nordabfall des zentralen Kaukasus (Tschetscheno-Ingusetien und Daghestan),
Georgien, Südabfall des zentralen Kaukasus.

L. valentini spitzenbergerae EISELT, DAREWSKIJ & SCHMIDTLER, 1992

Südöstlichste Türkei: Cilo-Sat Gebirge in Vilayet Hakkâri.

(*Timon* TSCHUDI, 1836) [Perleidechsen]

L. lepida iberica LÓPEZ SEOANE, 1884

NW-Spanien und NW-Portugal.

Literatur

- BISCHOFF, W. (1991a): Übersicht der Arten und Unterarten der Familie Lacertidae 2. Die Gattungen *Eremias*, *Gallotia*, *Gastropholis*, *Hellobolus*, *Holaspis* und *Ichnotropis*. - DIE EIDECHSE, Bonn/Bremen, 2: 14-21.
- (1991b): Übersicht der Arten und Unterarten der Familie Lacertidae 3. Die Gattung *Lacerta*. - DIE EIDECHSE, Bonn/Bremen, 3: 5-16.
- (1992): Übersicht der Arten und Unterarten der Familie Lacertidae 6. Die Gattungen *Poromera*, *Psammodromus*, *Pseuderemias*, *Takydromus* und *Tropidosaura*. - DIE EIDECHSE, Bonn/Bremen, 6: 13-17.
- BÖHME, W. & N.N. SCHTSCHERBAK (1991): Ein neuer Wüstenrenner aus dem Hochland Afghanistans, *Eremias (Eremias) afghanistanica* sp.n. (Reptilia: Sauria: Lacertidae). - Bonn. zool. Beitr., 42(2): 137-141.
- EISELT, J. & I.S. DAREWSKIJ (1991): *Lacerta rudis chechenica* ssp.n. aus dem Kaukasus (Reptilia: Lacertidae). Ann. Naturhist. Mus. Wien, 92(B): 15-29.
- EISELT, J., I.S. DAREWSKIJ & J.F. SCHMIDTLER (1992): Untersuchungen an Felseidechsen (*Lacerta saxicola*-Komplex, Reptilia: Lacertidae) in der östlichen Türkei. 1. *Lacerta valentini* BOETTGER. - Ann.Naturhist.Mus.Wien, 93(B): 1-18.
- JERIOMTSCHENKO, W. K., A. M. PANFILOW & E. I. ZARINENKO (1992): Konspekt issledowanii po z itogenetike i sistematike nekotorych asiatskikh widow Scincidae i Lacertidae. - Bischkek (ILIN), 182 S.
- MATEO, J.A. & J. CASTROVIEJO (1991): Variation morphologique et révision taxonomique de l'espece *Lacerta lepida* DAUDIN 1802 (Sauria, Lacertidae). - Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris, 4^e sér., 12, 1990 (1991), section A, n^{OS} 3-4: 691-706.

Verfasser: WOLFGANG BISCHOFF, Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig, Adenauerallee 150-164, D-53113 Bonn.