

de la queue, tronquées à leur extrémité; face supérieure du ♂ brun clair ou gris clair, très rarement olive ou verte, avec dessin noir ou brun peu ou modérément développé; bande pariétale en taches plus ou moins transversales, mais généralement petites; raie supraciliaire plus ou moins continue à l'avant, en ocelles plus loin; ocelles postoculaires petits, blanchâtres, peu nombreux, ou même complètement absents: face inférieure blanche, rougeâtre ou rouge brique

parvula Lantz et Cyrén.

Internasale plus large que longue, généralement bien séparée de la rostrale; rangée de granules supraciliaires généralement complète, parfois légèrement interrompue; postciliaire généralement en contact avec la pariétale; postnasale presque toujours en contact avec l'internasale; première supratemporale assez courte, non ou peu amincie vers l'arrière; les autres petites, parfois indistinctes; massétérique presque toujours très grande et généralement séparée de la première supratemporale par une seule écaille; parfois partagée en deux; tympanique généralement grande ou très grande, séparée de la massétérique par 1 à 3, rarement 4 rangées d'écailles moyennes, plus grandes que les autres temporales; 25-29-35 gulaires dans la ligne médiane; collier non échancré; dorsales lisses, légèrement bombées, non ou à peine agrandies vers les flancs, au nombre de 44-51-55 autour du milieu du tronc; préanale toujours présente; 16-20/20-24 pores fémoraux de chaque côté; supratibiales généralement égales ou un peu plus petites que les dorsales, légèrement agrandies au milieu de la jambe, légèrement ou à peine carénées; supracaudales assez fortement carénées, à carènes modérément divergentes de l'axe de la queue, tronquées à leur extrémité; région dorsale du ♂ roussâtre sur le cou et vers la base de la queue, verte sur le reste, avec dessin noir généralement bien développé; bande pariétale en taches généralement étendues et transversales; raie supraciliaire en petits ocelles clairs peu apparents souvent plus ou moins effacés; ocelles postoculaires du ♂ grands, nombreux et souvent bleus tout le long des flancs; face inférieure généralement blanchâtre, parfois jaune *mehelyi*, n. subsp.

Internasale plus large que longue, généralement séparée de la rostrale; rangée de granules supraciliaires généralement

complète, parfois légèrement interrompue; postciliaire très souvent en contact avec la pariétale; postnasale toujours en contact avec l'internasale; première supratemporale large à l'avant, rétrécie vers l'arrière, mais non pointue; les autres moyennes ou petites, parfois indistinctes; massétérique moyenne ou grande, toujours séparée de la première supratemporale; tympanique grande, parfois partagée en deux, séparée de la massétérique par 1 ou 2, rarement 3 rangées d'écailles beaucoup plus grandes que les autres temporales; 24-27-31 gulaires dans la ligne médiane; collier non échancré; dorsales lisses, légèrement bombées ou même légèrement coniques vers l'arrière du dos, non agrandies vers les flancs, au nombre de 48-51-55 autour du milieu du tronc; préanale presque toujours présente; 17-19/19-22 pores fémoraux de chaque côté; supratibiales généralement plus petites que les dorsales, légèrement ou modérément carénées; supracaudales assez fortement carénées, à carènes peu ou modérément divergentes de l'axe de la queue, tronquées à leur extrémité; face supérieure du ♂ brun plus ou moins foncé, parfois olivâtre, mais pas verte, avec dessin noir peu apparent; bande pariétale en taches très petites, peu apparentes, non transversales; raie supraciliaire en points clairs assez apparents à l'avant; ocelles postoculaires du ♂ petits, mais assez nombreux, les 2 ou 3 premiers bleus, les autres blanchâtres; face inférieure blanchâtre ou jaune

tristis, n. subsp.

Internasale un peu plus large ou aussi large que longue, assez rarement en contact avec la rostrale, mais s'en rapprochant généralement de près; rangée de granules supraciliaires complète ou légèrement interrompue; postciliaire assez souvent en contact avec la pariétale; postnasale toujours en contact avec l'internasale; première supratemporale longue ou moyenne, non pointue à l'arrière; les autres petites ou indistinctes, surtout les dernières; massétérique généralement grande, n'atteignant qu'exceptionnellement la première supratemporale; tympanique séparée de la massétérique par 2 à 4 rangées d'écailles souvent plus grandes que les autres temporales; 24-29-36 gulaires dans la ligne médiane; collier non ou à peine échancré; dorsales assez fortement bombées ou coniques, ou même légèrement carénées, surtout vers l'arrière, à peine ou sensiblement