

но бокамъ головы иногда въ дѣйствительности сливаются въ двѣ или три продольныя полосы. Другіе экземпляры бываютъ не только глазчаты, или покрыты только темнобурными кольчатыми пятнами, которыя могутъ быть расположены тѣсно другъ отъ друга въ поперечномъ направленіи и давать начало рисунку, похожему на цѣпь. Верхняя сторона ногъ и передней части хвоста въ общемъ имѣетъ такой же рисунокъ какъ и туловище, только онъ менѣе рѣзко выраженъ, иногда же существуетъ только въ видѣ слѣда. Нижняя сторона желтоватая или зеленватая (№ 6866); внѣшніе брюшныя щитки имѣютъ темный палетъ, или въ ясныхъ темнобурныхъ и черноватыхъ пятнахъ. Челюсти и горло желтыя или съ синеваато-зеленымъ палетомъ, который иногда переходитъ въ буросѣрый. У экземпляровъ, окрашенныхъ сверху въ свѣтлый цвѣтъ, нижняя сторона всѣхъ частей тѣла желтая, безъ всякихъ пятенъ; пѣтъ у нихъ также и темныхъ крапенокъ на щиткахъ головы. Можетъ встрѣтиться еще одна форма рисунка, которая въ такой степени отличается наше животное, что это измѣненіе заслуживаетъ установленія особаго варіетета; это именно грубопятнистая *arguta* (№ 5165); она была добыта г. Потанинымъ въ пустынѣ вблизи горнаго хребта Салбурты, на юго-зап. отъ Булуць-тохой въ Джунгаріи, и названа мной var. *Potanini*. Экземпляры этой формы свѣтло бурога цвѣта съ двумя рядами чрезвычайно большихъ, расположенныхъ косо другъ относительно друга, темнобурныхъ пятенъ. Пятна имѣютъ ясно выраженные свѣтлыя каемки, или сопровождаются мелкими свѣтлыми круглыми пятнышками. На бокахъ тѣла находятся однѣ или два мелкихъ темныхъ пятна, а на верхней сторонѣ хвоста обнаруживаются многія такія пятна, которыя до нѣкоторой степени образуютъ продолженіе спинныхъ рядовъ.

Сравнительныя замѣтки. — Изъ изложеннаго выше описанія я замѣтую слѣдующіе діагностическіе признаки: Общая длина: 182 мм. Тѣлосложеніе неуклюжее, съ пирамидальной головой, умѣренно длинной, то остро, то широко закругленной мордой, короткими и массивными ногами и короткими, достигающими почти половины общей длины, хвостомъ. Затылочнаго щитка нѣтъ. Длина темянныхъ по большей части превосходить ихъ ширину, длина лоботемянныхъ больше ихъ

zwei oder drei Längsstreifen zusammen. Andere Exemplare wiederum sind unvollkommen geaugt oder nur mit dunkelbraunen Ringflecken versehen, die der Quere nach dicht aneinander gestellt sein können und eine kettenartige Zeichnung hervorbringen. Die Oberseite der Beine und des Vordertheils des Schwanzes ist im Grossen und Ganzen ebenso gezeichnet wie der Rumpf, nur sind die Zeichnungen weniger scharf ausgebildet, mitunter nur in Spuren vorhanden. Die Unterseite ist gelblich oder grünlich (№ 6866); die äusseren Bauchtafeln zeigen dunklen Anflug oder sind deutlich dunkelbraun und schwärzlich gefleckt. Kinnladen und Kehle sind gelb oder mit Anflug von Blaugrün, das sich mitunter ins Braungraue umsetzt. Bei den oberseits licht gefärbten Exemplaren bleibt die Unterseite aller Körpertheile gelb, ohne alle Fleckenbildung; auch fehlen ihnen die dunklen Sprengel auf den Kopf tafeln. Es kann noch eine Zeichnungsform auftreten, welche unser Thier derart kennzeichnet, dass diese Abänderung als besondere Varietät aufgestellt zu werden verdient; dies ist nämlich die grobgefleckte *arguta* (№ 5165); sie wurde von Herrn Potanin in der Wüste in der Nähe des Gebirges Salburty, s. w. von Bulun-Tochoi in Tschungarien, erbeutet und von mir als Var. *Potanini* bezeichnet. Die Exemplare dieser Abart sind lichtbraun und mit zwei Reihen auffallend grosser, schräg zu einander gestellter, dunkelbrauner Flecken versehen. Die Flecken haben einen undeutlich ausgeprägten hellen Saum oder sind von kleinen, hellen Rundmakeln begleitet. An den Leibeseiten sind ein oder zwei kleine, dunkle Flecken vorhanden, und auf der Schwanzoberseite zeigen sich mehrere solche Flecke, die gewissermassen die Fortsetzung der dorsalen Rückenserien bilden.

Vergleichende Bemerkungen. — Der vorstehenden Beschreibung entnehme ich folgende diagnostische Merkmale: Totallänge: 182 mm. Von plumpem Körperbau, mit pyramidalem Kopf, mässig langer, bald spitz, bald breit verrundeter Schnauze, kurzen und stämmigen Beinen und kurzem, ungefähr die Hälfte der Gesamtlänge betragendem Schwanz. Kein Occipitale, Parietale meistens länger als breit; Frontoparietale länger als breit; 3. Supraoculare fehlend oder vorhanden, im