

LACERTA VIRIDIS *Lagarto verde*

Lám. 73

Cat.: Llargandaix verd. Vas.: Muxker. Gall.: Lagarto arnal.

Identificación. Adultos hasta 13 cm de hocico a cloaca; hasta 40 cm incluyendo la cola, pero normalmente más pequeños. Lagarto medianamente grande de aspecto estilizado con la cola muy larga y cabeza relativamente corta. Collar formado por 7 a 12 escamas. Partes superiores de color verde con pequeñas manchas negras. Hembras también verdes o parduscas, pudiendo presentar manchas oscuras irregulares y 2 ó 4 líneas laterales blancas más o menos interrumpidas y frecuentemente bordeadas de puntos negros. Las partes inferiores son amarillas sin manchas negras y la garganta es azul en los machos y también en algunas hembras. Los jóvenes suelen ser verdes grisáceos o pardos con 2 ó 4 líneas laterales blancas.

Especies parecidas. *Lacerta schreiberi* (pág. 108) y jóvenes de *Lacerta lepida* (pág. 104).

Hábitat. Zonas soleadas con densa vegetación en bordes de bosque o matorral denso. En la Península Ibérica es también frecuente en zonas húmedas y altas, llegando hasta los 1800 m de altitud.

Biología. Trepa muy bien por las ramas de matorrales, donde frecuentemente caza. Por la noche, o cuando es molestado, suele ocultarse en las partes bajas de los arbustos, debajo de los troncos, grietas de rocas o madrigueras de roedores. Su alimentación, aunque básicamente insectívora, no está exenta de pequeños frutos o huevos de reptiles, incluso pequeños pájaros. Las puestas se inician sobre el mes de abril, prolongándose en algunas zonas hasta el mes de junio. El período de incubación es de 3 ó 4 meses, al cabo del cual nacen los pequeños lagartos, que suelen medir sobre 7 cm de longitud total.

Distribución. Presente únicamente en una estrecha franja, al norte de la Península, que comprende: parte de Asturias, Santander, País Vasco, Sistema Ibérico y Pirineos. Mapa 40.

Lámina 73

Lacerta viridis. Lagarto verde.

Lámina 74

Lacerta vivipara. Lagartija de turbera.

