


# Lucertola campestre

*Podarcis sicula campestris* De Betta, 1857



## Tassonomia e descrizione

Raggiunge dimensioni leggermente superiori a quelle della Lucertola muraiola, dalla quale si distingue agevolmente per avere due vistose bande dorsali longitudinali verdi e le parti inferiori biancastre immacolate. I fianchi sono vermicolati di biancastro, bruno e nero, spesso con ocelli azzurri. Maschi più grandi e con corporatura più robusta e massiccia e pori femorali più sviluppati delle femmine.

## Distribuzione generale

Ampliamente distribuita soprattutto nell'Italia peninsulare e in Sicilia, di norma non oltre i 1.000 m di quota. Nelle regioni settentrionali la sua presenza è limitata alle zone costiere e alla pianura.

## Distribuzione e Habitat in provincia

Ben diffusa sul territorio provinciale (62,5% dei quadranti).

Specie estremamente adattabile ad una ampia gamma di ambienti, si rivela comunque più termofila della congenere, preferendo gli ambienti costieri o, nell'interno, quelli più aperti e assolati. La specie è stata

osservata in tutte le fasce altitudinali della provincia.

**Note di biologia**

Attiva in genere da febbraio-marzo a ottobre-novembre, può riprodursi fino a due volte l'anno. Le femmine depongono in genere da due a cinque uova per volta.

**Stato di conservazione e normative di tutela**

La specie compare nell'Allegato II della Convenzione di Berna, nell'Allegato IV (D) della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva "Habitat") ed è protetta dalla Legge Regionale 15/2006 «Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna». Non appare attualmente minacciata nel territorio indagato.