

LACERTA VIVIPARA *Lagartija de turbera*

Lám. 74

Identificación. Adultos hasta 6,5 cm de hocico a cloaca; hasta 18 cm incluyendo la cola, aunque sólo en casos excepcionales. Cuerpo muy poco aplanado con cabeza y extremidades pequeñas. Collar aserrado formado por 7 a 9 escamas. Partes superiores de color pardo, bronceadas, grisáceas o negras. Presenta una línea vertebral más o menos continua y los laterales suelen ser oscuros bordeados de una línea clara. Los machos pueden carecer de la línea vertebral oscura, presentando las partes inferiores anaranjadas o rojizas con puntos negros; en las hembras son amarillentas y sin puntos negros. Los machos y algunas hembras en celo suelen presentar la garganta azulada. Los jóvenes son casi negros.

Especies parecidas. Principalmente *Lacerta muralis* (pág. 106). Es más aplanada que *Lacerta vivipara*, con la cabeza mayor, extremidades mejor desarrolladas y el collar no claramente aserrado.

Hábitat. En la Península Ibérica es una especie que ocupa típicamente zonas de alta montaña, encontrándose en turberas, prados y zonas cercanas a lagunas y arroyos de gran altitud.

Biología. Lagartija de suelo y con un período de actividad muy corto. En el norte de su área de distribución europea, los huevos se incuban en el interior de la hembra, dando ésta luz a crías vivas. Es por tanto el único caso de ovoviviparismo en esta familia. Sin embargo, en las poblaciones de la Península Ibérica, las hembras frecuentemente ponen huevos que pueden tardar varios días en eclosionar. El período de incubación suele ser de 3 meses, y la puesta, cuando existe, consta de un máximo de 15 huevos.

Distribución. En la Península Ibérica, únicamente en la Cordillera Cantábrica y en los Pirineos. Mapa 41.

